

## FKIs:

**Nicorette® 10 mg/16 h, 15 mg/16 h, 25 mg/16 h - transdermales Pflaster; Qualitative und quantitative Zusammensetzung:** Transdermales Pflaster mit 1,75 mg Nicotin/cm<sup>2</sup> in Stärken von 10 mg/16 h (Größe = 9,0 cm<sup>2</sup>, enthält 15,8 mg Nicotin); 15 mg/16 h (Größe = 13,5 cm<sup>2</sup>, enthält 23,6 mg Nicotin); 25 mg/16 h (Größe = 22,5 cm<sup>2</sup>, enthält 39,4 mg Nicotin). **Liste der sonstigen Bestandteile:** mittelkettige Triglyceride, basisches Butylmethacrylat-Copolymer, Polyethylenterephthalat-Film (PET); Acrylat-Matrix: Acrylische Klebelösung, Kaliumhydroxid, Croscarmellose-Natrium, Aluminiumacetylacetonat; Abziehfolie: Polyethylenterephthalat-Film (PET) eine Seite aluminisiert, beide Seiten silikonisiert; Drucktinte: Epoxy-amin 2 Komponenten Tinte für pharmazeutische Anwendungen. **Pharmakotherapeutische Gruppe:** Behandlung der Nicotinabhängigkeit, Nicotin ATC - Code: N07B A01; **Anwendungsgebiete:** Behandlung der Tabakabhängigkeit durch Linderung der Entzugssymptome. Unterstützende Raucherentwöhnung. Hilfsmittel für Raucher während temporärer Abstinenz für Zeiträume, in denen ein Zigarettenkonsum nicht möglich oder unerwünscht. Zusätzliche Beratung und unterstützende Maßnahmen können Erfolgsrate verbessern. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile oder das Pflaster selbst; Gelegenheits- und Nichtraucher; Kinder < 12 Jahren. **Stand der Information:** Januar 2015

**Nicorette Spray 1 mg/Sprühstoß Spray zur Anwendung in der Mundhöhle, Lösung. Qualitative und quantitative Zusammensetzung:** Ein Sprühstoß setzt 1 mg Nicotin in 0,07ml Lösung frei. 1ml Lösung enth. 13,6 mg Nicotin. Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wirkung: Ethanol (<100mg Ethanol/Sprühstoß). **Liste der sonstigen Bestandteile:** Propylenglykol, Ethanol, H<sub>2</sub>O-frei, Trometamol, Poloxamer 407, Glycerol, Natriumhydrogencarbonat, Levomenthol, Minzaroma, Kühlendes Aroma, Sucralose, Acesulfam-Kalium, HCl (zur pH-Wert- Einstellung), ger. H<sub>2</sub>O. **Pharmakotherapeutische Gruppe:** Behandlung der Nicotinabhängigkeit. ATC-Code: N07BA01. **Anwendungsgebiete:** Behandlung der Tabakabhängigkeit bei Erw. durch Linderung der Nicotinentzugssymptome, einschließlich Rauchverlangens, beim Versuch das Rauchen aufzugeben. Endgültiges Ziel: komplette Einstellung des Rauchens. Anw. vorzugsweise in Verbindung mit Beratung und unterstützenden Maßnahmen. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen Nicotin oder sonstige Bestandteile; Kinder <18 Jahre; Personen, die nie geraucht haben. **Stand der Information:** November 2015