Fachkurzinformationen:

Nicorette® 2 mg / 4 mg Freshfruit / Icemint - Kaugummi zur Raucherentwöhnung; Qualitative und quantitative Zusammensetzung: 1 Stück enthält 2 mg/4 mg Nicotin (als Nicotinresinat). **Sonstige Bestandteile mit bekannter Wirkung:** Nicorette 2 mg/4 mg:1 Kaugummi enthält 161,9 mg/152,3 mg Sorbitol, Spuren von Butylhydroxytoluol (E 321). Nicorette Freshfruit 2 mg/4 mg und Nicorette Icemint 2 mg/4 mg enthalten Spuren von Butylhydroxytoluol (E 321). **Liste der sonstigen Bestandteile:** Nicorette 2 mg/4 mg: Kaugummibasis (enthält Butylhydroxytoluol (E 321)), Natriumcarbonat, Natriumhydrogencarbonat (nur Nicorette 2 mg), Sorbitol, Glycerol, Geschmackstoffe, Chinolingelb (E 104) (nur Nicorette 4 mg). Nicorette Freshfruit 2 mg/4 mg: Kern: Kaugummibasis (enthält Butylhydroxytoluol (E 321)), Xylitol, Pfefferminzöl, Natriumcarbonat H_2O-frei, Natriumhydrogencarbonat (nur Nicorette Freshfruit 2 mg), Acesulfam Kalium, Menthol, leichtes Magnesiumoxid, Chinolingelb (E 104) (nur Nicorette Freshfruit 4 mg); Überzug (Zwischenschicht): Tuttifrutti QL84441, Hypromellose, Sucralose, Polysorbat 80; Überzug (Außenschicht): Xylitol, Arabisches Gummi, Titandioxid (E 171), Tuttifrutti QL84441, Carnaubawachs, Chinolingelb (E 104) (nur Nicorette Freshfruit 4 mg). Nicorette Icemint 2 mg/4 mg: Kern: Kaugummibasis mit abrasiven Eigenschaften (enthält Butylhydroxytoluol (E 321)), Xylitol, Pfefferminzöl, Natriumcarbonat H_2O-frei, Natriumhydrogencarbonat (nur Nicorette Icemint 2 mg), Acesulfam Kalium, Menthol, leichtes Magnesiumoxid, Chinolingelb (E 104) (nur Nicorette Icemint 4 mg)**;** Überzug (Zwischenschicht): Winterfresh, Hypromellose, Sucralose, Polysorbat 80; Überzug (Außenschicht): Xylitol, Stärke vorgelatiniert, Titandioxid (E 171), Winterfresh, Carnaubawachs, Chinolingelb (E 104) (nur Nicorette Icemint 4 mg). **Pharmakotherapeutische Gruppe:** Behandlung der Nicotinabhängigkeit, Nicotin; ATC - Code: N07B A01. **Anwendungsgebiete:** Behandlung der Tabakabhängigkeit, um Verlangen nach Nicotin und Entzugserscheinungen zu lindern. Zur Raucherentwöhnung bei Rauchern, die das Rauchen aufgeben wollen. Hilfsmittel für Raucher während temporärer Abstinenz für Zeiträume, in denen Zigarettenkonsum nicht möglich ist. Reduktion des Zigarettenkonsums bei Rauchern, die das Rauchen nicht aufgeben wollen oder können. Zusätzliche Beratung und unterstützende Maßnahmen können Erfolgsrate verbessern. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen Wirkstoff oder sonstige Bestandteile; Kinder <12 Jahren, Gelegenheits- und Nichtraucher. **Stand der Information:** Januar 2015

Nicorette® 10 mg/16 h, 15 mg/16 h, 25 mg/16 h - transdermales Pflaster; Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Transdermales Pflaster mit 1,75 mg Nicotin/cm² in Stärken von 10 mg/16 h (Größe = 9,0 cm², enthält 15,8 mg Nicotin); 15 mg/16 h (Größe = 13,5 cm², enthält 23,6 mg Nicotin); 25 mg/16 h (Größe = 22,5 cm², enthält 39,4 mg Nicotin). **Liste der sonstigen Bestandteile:** mittelkettige Triglyceride, basisches Butylmethacrylat-Copolymer, Polyethylenterephthalat-Film (PET); Acrylat-Matrix: Acrylische Klebelösung, Kaliumhydroxid, Croscarmellose-Natrium, Aluminiumacetylacetonat; Abziehfolie: Polyethylenterephthalat-Film (PET) eine Seite aluminisiert, beide Seiten silikonisiert; Drucktinte: Epoxy-amin 2 Komponenten Tinte für pharmazeutische Anwendungen. **Pharmakotherapeutische Gruppe:** Behandlung der Nicotinabhängigkeit, Nicotin ATC - Code: N07B A01; **Anwendungsgebiete:** Behandlung der Tabakabhängigkeit durch Linderung der Entzugssymptome. Unterstützende Raucherentwöhnung. Hilfsmittel für Raucher während temporärer Abstinenz für Zeiträume, in denen ein Zigarettenkonsum nicht möglich oder unerwünscht. Zusätzliche Beratung und unterstützende Maßnahmen können Erfolgsrate verbessern. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile oder das Pflaster selbst; Gelegenheits- und Nichtraucher; Kinder < 12 Jahren. **Stand der Information:** Januar 2015

Nicorette® 15 mg – Inhalationen zur Raucherentwöhnung; Qualitative und quantitative Zusammensetzung: 1 Patrone enthält 15 mg Nicotin (davon werden 7 mg freigesetzt). **Liste der sonstigen Bestandteile:** Levo-Menthol, poröse Kunststoffschicht aus Polyethylen. **Pharmakotherapeutische Gruppe:** Behandlung der Nicotinabhängigkeit, Nicotin ATC - Code: N07B A01; **Anwendungsgebiete:** Behandlung der Tabakabhängigkeit, um Verlangen nach Nicotin und Entzugserscheinungen zu lindern. Zur Raucherentwöhnung bei Rauchern, die das Rauchen aufgeben wollen. Hilfsmittel für Raucher während temporärer Abstinenz für Zeiträume, in denen ein Zigarettenkonsum nicht möglich oder unerwünscht. Zur Reduktion des Zigarettenkonsums bei Rauchern, die das Rauchen nicht aufgeben wollen oder können. Zusätzliche Beratung und unterstützende Maßnahmen können Erfolgsrate verbessern. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen Wirkstoff oder sonstige Bestandteile; Gelegenheits- und Nichtraucher; Kinder <12 Jahren. **Stand der Information:** Januar 2015

Nicorette® Mint Spray/Nicorette® Fruit & Mint Spray, 1 mg/Sprühstoß, Spray zur Anwendung in der Mundhöhle, Lösung. Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Ein Sprühstoß setzt 1 mg Nicotin in 0,07 ml Lösung frei. 1 ml Lösung enth. 13,6 mg Nicotin. Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wirkung: Ethanol 7,1 mg/Sprühstoß, Propylenglycol (Mint Spray: 11 mg/Sprühstoß; Fruit & Mint Spray: 12 mg/Sprühstoß) und Butylhydroxytoluol 363 ng/Sprühstoß. **Liste der sonstigen Bestandteile:** Propylenglykol (E1520), Ethanol, H_2O-frei, Trometamol, Poloxamer 407, Glycerol (E422), Natriumhydrogencarbonat, Levomenthol, Minze Aroma, Frische-Aroma, Sucralose, Acesulfam-Kalium, Butylhydroxytoluol (E321), Salzsäure (zur pH-Wert- Einstellung), ger. H_2O. **Pharmakotherapeutische Gruppe:** Behandlung der Nicotinabhängigkeit. ATC-Code: N07BA01. **Anwendungsgebiete:** Nicorette Mint/Fruit & Mint Spray wird angewendet zur Behandlung der Tabakabhängigkeit bei Erwachsenen durch Linderung der Nicotinentzugssymptome, einschließlich des Rauchverlangens, beim Versuch das Rauchen aufzugeben. Die komplette Einstellung des Rauchens sollte das endgültige Ziel sein. Nicorette Mint/Fruit & Mint Spray sollte vorzugsweise in Verbindung mit Beratung und unterstützenden Maßnahmen angewandt werden. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen Nicotin oder einen der sonstigen Bestandteile; Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre; Personen, die nie geraucht haben. **Stand der Information:** August 2018

Nicorette® Icemint 2 mg- /4 mg- Lutschtabletten; Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Jede Lutschtablette enthält 2 mg/4 mg Nicotin (als Nicotinresinat). **Liste der sonstigen Bestandteile:** Tablettenkern: Mannitol (E421), Xanthangummi, Winterfresh RDE4-149 sprühgetrocknet (Gummi Arabicum (E414), Pfefferminz-, Menthol- und Eucalyptol-Aroma), Natriumcarbonat, H_2O-frei (E500)(i), Sucralose (E955), Acesulfam-Kalium (E950), Magnesiumstearat (E470b), Überzug: Hypromellose (E464), Winterfresh RDE4-149 (Pfefferminz-, Menthol- und Eucalyptol-Aroma), Titandioxid (E171), Sucralose (E955), Sepifilm Gloss (Hypromellose (E464), mikrokristalline Cellulose (E460), Kaliumaluminiumsilikat (E555), Titandioxid (E171)), Acesulfam-Kalium (E950), Polysorbat 80 (E433). **Pharmakotherapeutische Gruppe:** Behandlung der Nicotinabhängigkeit. ATC-Code: N07B A01, (Raucherentwöhnung: N07BA, Nicotin: 01.). **Anwendungsgebiete:** Raucher ab 18 Jahren zur Behandlung der Tabakabhängigkeit durch Linderung der Nicotinentzugssymptome und des Rauchverlangens. Langfristiges Behandlungsziel: Rauchen dauerhaft aufzugeben. Anw. vorzugsweise in Verbindung mit einem unterstützenden Verhaltensprogramm. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen Nicotin oder sonstige Bestandteile, Kinder <12 Jahren, Personen, die nie geraucht haben. **Stand der Information:** Dezember 2016

Inhaber der Zulassung: Johnson & Johnson GmbH, Wien, Österreich; **Verschreibungs-/Apothekenpflicht:** Rezeptfrei, Apothekenpflichtig. Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit und Nebenwirkungen entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation.