

Fachkurzinformation Infludoron® Globuli

Qualitative und quantitative Zusammensetzung: 100 g enthalten: 0,1 g Aconitum napellus. D1; 0,6 g Bryonia D1; 0,5 g Eucalyptus globulus Ø (= D1); 0,4 g Eupatorium perfoliatum D1; 1,0 g Ferrum phosphoricum D6; 0,1 g Schoenocaulon officinale (Sabadilla) Ø (= D1). **Liste der sonstigen Bestandteile:** Saccharose, Lactose-Monohydrat (in Spuren). **Anwendungsgebiete:** Gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis gehören zu den Anwendungsgebieten: Grippale Infekte und fieberhafte Erkältungskrankheiten. Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels der anthroposophischen Therapierichtung in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf anthroposophischer Erfahrung. Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt. Infludoron® Globuli werden angewendet von Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen einen der Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile. **Inhaber der Zulassung:** Weleda Ges.m.b.H. & Co KG, Hosnedlgasse 27, AT-1220 Wien, Tel.: 01 256 60 60; E-mail: dialog@weleda.at. **Rezeptpflicht/Apothekenpflicht:** Rezeptfrei, apothekenpflichtig. **Wirkstoffgruppe:** V03AX. **Stand der Information:** 06/2014. Weitere Informationen sind der veröffentlichten Fachinformation unter www.basg.at zu entnehmen.

Freiwillige Inhalte:

(Diese Textpassagen können freiwillig in die FKI aufgenommen werden - Keine Pflichtangaben!)

Dosierung: *Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:* 15 Globuli alle 1-2 Stunden, *Kinder von 6-11 Jahren:* 8-10 Globuli alle 1-2 Stunden, *Kinder von 1-5 Jahren:* 5-10 Globuli 3-4 x täglich, *Kinder im ersten Lebensjahr:* 3-5 Globuli 3-4 x täglich. Fieberhafte Erkrankungen bei Kindern unter 1 Jahr sollten grundsätzlich ärztlich überwacht werden. Bei beginnender Besserung oder nach Abklingen des Fiebers 2-3 x täglich eine Einzeldosis bis zur vollständigen Genesung einnehmen.

Schwangerschaft und Stillzeit: Es liegen keine Hinweise für ein besonderes Risiko für die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit vor.

Bei der Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit ist Vorsicht geboten.

Änderungsindex:

Version	Erstellt von	Datum	Stand der FI	Änderungsgrund
1	JM	08.06.2012	06/2011	Neuerstellung (Ferrum phosphoricum comp. Globuli)
2	JM	12.07.2012	06/2011	(Ferrum phosphoricum comp. Globuli). Korrektur Tippfehler
03	JM	19.04.2013	01/2013	Namensänderung auf Infludoron Globuli. Pharmakotherapeutische Gruppe gestrichen Stand der Information aktualisiert;
04	JM	05.06.2014	01/2013	Pharmakotherapeutische Gruppe: Andere therapeutische Mittel. ATC Code: V03AX. eingefügt. Freiwillige Elemente in blauer Farbe.
05	SA	01.08.2014	06/2014	Lactose-Monohydrat zu Liste der sonstigen Bestandteile hinzugefügt. SSW: neu: Es liegen keine Hinweise für ein besonderes Risiko vor. Faxnummer gestrichen; Pharmakotherapeutische Gruppe in

				Wirkstoffgruppe umbenannt. Stand der Information aktualisiert.
06	SA	10.06.2015	06/2014	Entfernung: „Bezeichnung des Arzneimittels“, Herausnahme der Kapitel „Dosierung und Art der Anwendung“ und „Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit“ und Einfügung unter „Freiwillige Inhalte“
07	SA	22.10.2018	06/2014	Zulassungsinhaber: Ges.m.b.H. & Co KG statt GmbH & Co KG