

# FACH-KURZINFORMATION

## BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

ADOLORIN® Ibuforte EXPRESS 400 mg Filmtabletten

## QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZUSAMMENSETZUNG

Eine Filmtablette enthält 684,0 mg Ibuprofen-Lysin, entsprechend 400,0 mg Ibuprofen.  
Vollständige Auflistung der sonstigen Bestandteile, siehe Abschnitt 6.1.

## ANWENDUNGSGEBIETE

- Zur Behandlung von Schmerzzuständen (z. B. Rückenschmerzen, Zahnschmerzen, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Menstruationsbeschwerden, Nervenschmerzen).
- Zur Behandlung der akuten Kopfschmerzphase bei Migräne mit und ohne Aura und zur Behandlung von Spannungskopfschmerzen.
- Zur Behandlung von Schmerzen und/oder Fieber bei Erkältungskrankheiten und grippalen Infekten.

ADOLORIN Ibuforte EXPRESS 400 mg Filmtabletten werden angewendet bei Erwachsenen und Jugendlichen.

## GEGENANZEIGEN

- Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile;
- Überempfindlichkeitsreaktionen in der Anamnese (z. B. Bronchospasmus, Asthma, Rhinitis, Angioödem oder Urtikaria) im Zusammenhang mit Acetylsalicylsäure, Ibuprofen oder anderen nicht-steroidalen Antiphlogistika;
- Patienten mit schwerer Leberinsuffizienz, schwerer Niereninsuffizienz oder schwerer Herzinsuffizienz (NYHA-Klasse IV);
- Gastrointestinale Blutung oder Perforation in der Anamnese, bedingt durch vorangegangene NSAR-Therapie; aktive peptische Ulzera oder Blutungen oder rezidivierende peptische Ulzera oder Blutungen in der Anamnese (zwei oder mehr Episoden nachgewiesener Ulzeration oder Blutung);
- zerebrovaskuläre oder andere aktive Blutungen;
- ungeklärte Blutbildungsstörungen;
- schwere Dehydratation, hervorgerufen durch Erbrechen, Durchfall oder unzureichende Flüssigkeitsaufnahme;
- im letzten Schwangerschaftsdrittel (siehe Abschnitt 4.6);
- Kinder unter 12 Jahren und unter 40 kg Körpergewicht.

## LISTE DER SONSTIGEN BESTANDTEILE

### *Tablettenkern:*

mikrokristalline Cellulose, siliciumdioxid-beschichtet  
Copovidon  
Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A)  
Magnesiumstearat

### *Tablettenüberzug:*

Opadry 200 White enthält: Polyvinylalkohol (teilhydrolysiert), Titandioxid (E171), Talkum, Macrogol 4000, Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer, Natriumhydrogencarbonat

## **INHABER DER ZULASSUNG**

Kwizda Pharma GmbH  
Effingergasse 21  
1160 Wien  
Österreich

## **REZEPTPFLICHT/APOTHEKENPFLICHT**

Rezeptfrei, apothekenpflichtig.

## **PHARMAKODYNAMISCHE EIGENSCHAFTEN**

Pharmakotherapeutische Gruppe: Antiphlogistika und Antirheumatika, Nichtsteroidale Antiphlogistika und Antirheumatika, Propionsäurederivate; ATC-Code: M01AE01

## **STAND DER INFORMATION**

03/2024

Die Informationen zu den Abschnitten Warnhinweise, Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit und Nebenwirkungen sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen.