

Venosin® retard 50 mg – Kapseln: Zusammensetz.: 1 Kapsel enth. 240,0-290,0 mg Trockenextrakt aus Rosskastaniensamen (Extraktionsmittel Ethanol 50% (v/v)) entspr. 50 mg Triterpenglykoside, berechnet als wasserfreies β-Aescin. Sonst. Bestandt.: Dextrin, Copovidon, Talk, Eudragit, Triethylcitrat, Gelatine, Eisenoxid schwarz, rot u. gelb E 172, Titandioxid E171, Indigokarmin E 132, Chinolingelb E 104.

Anwendungsgebiet: Funktionsstörungen bei od. infolge v. Erkrankungen d. Beinvenen (Symptome d. chron. Veneninsuffizienz). **Gegenanz.:** Überempfindlichkeit geg. d. Wirkst. od. einen d. sonst. Bestandt. **ATC-Code:** C05CX. **Weitere Angaben:** s.

Fachinformation. Rezeptfrei, apothekenpflichtig. 07/22-1. **Pharm. Unternehmer:** Klinge Pharma GmbH, 83607 Holzkirchen, Deutschland

Venostasin®-Creme: Zusammensetz.: 100 g Creme enth. 3,8 g Trockenextrakt aus Rosskastaniensamen (4,5-5,5:1), Auszugsmittel: Ethanol 50 % (V/V). Sonst. Bestandt.: 175 mg Methyl-4-hydroxybenzoat, 75 mg Propyl-4-hydroxybenzoat, Ethanol, Emulgierender Cetylstearylalkohol, Natriumcetylstearylsulfat, Weißes Vaselin, Parfümöl Blumen und Kräuterduft (enth. u.a. Butylhydroxytoluol, Linalool, Zimtaldehyd u. Benzoate), Simeticon Emulsion 30 % (Simeticon, Polysorbat 65, Stearate, Mischung von Glycerol, Fettsäuren u. Mono, Di, u. Triglyceriden, Methylcellulose, Xanthangummi, Sorbinsäure, Benzoesäure, Schwefelsäure 98 %, gereinigtes Wasser), Gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiet:** Traditionelles pflanzl. Arzneimittel zur Linderung v. Beschwerden u. Schweregefühl i. d. Beinen aufgrund geringfügiger venöser Durchblutungsstörungen. Anwendung beruht ausschließlich aufgrund langjähriger Verwendung. **Gegenanz.:** Überempfindlichkeit geg. d Wirkst. od. einen d. sonst. Bestandt., geschädigte Haut, z. B. Verbrennungen, Ekzeme od. offene Wunden. **ATC-Code:** C05CX. **Weitere Angaben:** s. **Fachinformation.** Rezeptfrei, apothekenpflichtig. 12/19-1. **Pharm. Unternehmer:** Klinge Pharma GmbH, 83607 Holzkirchen, Deutschland

Venostasin®-Gel: Zusammensetz.: 100 g Gel enthalten 1 g Aescin. Sonst. Bestandt.: Propylenglycol (E 1520) (1 g pro 10 g Gel), 2-Propanol, Carbomer 980, Trolamin, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiet:** Zur Linderung v. Beschwerden u. Schweregefühl in d. Beinen aufgrund geringfügiger venöser Durchblutungsstörungen. Traditionelle pflanzl. Arzneispezialität, die ausschließl. auf Grund langjähriger Verwendung f. d. Anwendungsgebiet registriert ist. **Gegenanz.:** Überempfindlichkeit geg. d. Wirkst. od. einen d. sonst. Bestandt., geschädigte Haut z.B. b. Verbrennungen, Ekzemen od. offenen Wunden. **ATC-Code:** C05CX. **Weitere Angaben:** s. **Fachinformation.** Rezeptfrei, apothekenpflichtig. 05/22-1. **Pharm. Unternehmer:** Klinge Pharma GmbH, 83607 Holzkirchen, Deutschland